






โรงพยาบาลหัวหิน

วิธีปฏิบัติที่ WI - HNS 03 - 11

เรื่อง การใส่สายยางเข้าในกระเพาะอาหาร

ผู้จัดทำ	 (นางสาวสำเภา แซ่เล้า) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	วันที่ 1 มิถุนายน 2553
ทบทวนโดย	 (นางสาวสิริมา แสงสุวรรณ) หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล	วันที่ 1 มิถุนายน 2553
อนุมัติโดย	 (นางสาวอรุณี โชติกิตติพงศ์) หัวหน้ากลุ่มภารกิจระบบบริการสุขภาพ	วันที่ 1 มิถุนายน 2553

ฉบับที่ A

แก้ไขครั้งที่ 00

วันที่บังคับใช้ 1 มิ.ย. 2553

สถานะเอกสาร

เอกสารต้นฉบับ


วิธีปฏิบัติ โรงพยาบาลหัวหิน	เรื่อง การใส่สายยางเข้ากระเพาะอาหาร	
	เอกสารเลขที่ WI - HNS 03 - 11	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00
	วันที่บังคับใช้ 1 มิ.ย. 2553	หน้า 2 ของ 4

- วัตถุประสงค์**
1. เพื่อให้อาหาร น้ำ หรือยาแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารทางปาก
 2. เพื่อล้างกระเพาะอาหารด้วยน้ำให้สะอาด ในรายที่ได้รับสารพิษ หรือเตรียมผ่าตัดกระเพาะอาหาร

- คำนิยามศัพท์**
1. การใส่สายยางเข้าในกระเพาะอาหาร หมายถึง การใส่สายยาง หรือสายพลาสติกใส่เข้าทางปาก หรือจมูก ผ่านทางหลอดอาหารถึงกระเพาะอาหาร ใส่ทางปากเรียกว่า Orogastic intubation ใส่ทางจมูกเรียกว่า Nasogastric intubation

ขั้นตอนในการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ



วิธีปฏิบัติ โรงพยาบาลหัวหิน	เรื่อง การใส่สายยางเข้ากระเพาะอาหาร	
	เอกสารเลขที่ WI - HNS 03 - 11	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00
	วันที่บังคับใช้ 1 มิ.ย. 2553	หน้า 3 ของ 4

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในการใส่สายยางในกระเพาะอาหาร

ขั้นตอนในการปฏิบัติ

1. เตรียม Asepto syringe 1 อัน
2. K-Y Jelly , พลาสเตอร์ และกรรไกร
3. Stethoscope
4. สาย NG tube No.14-18 ในผู้ใหญ่ No. 5-12 ในเด็ก
5. ถุงมือ 1 คู่

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้อาหาร น้ำ ยา แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารทางปาก หรือเพื่อล้างกระเพาะอาหารในรายที่กินสารพิษ

- คำนิยามศัพท์ 1.
2.

ขั้นตอนในการปฏิบัติ

1. บอกและอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจ
2. จัดให้ผู้ป่วยนั่งหรือนอนศีรษะสูง (high fowler's position)
3. ใส่ถุงมือ และสายยาง และวัดความยาวที่ต้องการใส่ โดยวัดความยาวจากปลายจมูกถึงคิงหู และจากปลายคิงหูถึงปุ่มกระดูกอกในกรณีใส่ที่จมูก ถ้าใส่สายทางปากวัดจากคิงหูจนถึงปุ่มล่างขวากระดูกอก
4. บีบ K-Y Jelly ลงบน Gauze และหล่อลื่นปลายสาย
5. ใส่สายเข้ารูจมูกให้ผู้ป่วยแหงนหน้าเล็กน้อย แล้วค่อย ๆ สอดสายเข้าทางรูจมูก ให้สายเข้าสู่แนวโค้งตามธรรมชาติไปจนถึง Posterior nasopharynx แล้วให้ผู้ป่วยก้มหน้า พร้อมให้กลืน น้ำลาย ดันเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่วัดสายยางไว้

วิธีปฏิบัติ โรงพยาบาลหัวหิน	เรื่อง การใส่สายยางเข้ากระเพาะอาหาร	
	เอกสารเลขที่ WI - HNS 03 - 11	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00
	วันที่บังคับใช้ 1 มิ.ย. 2553	หน้า 4 ของ 4

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ทราบว่าสายยางอยู่ในกระเพาะอาหาร

ขั้นตอนในการปฏิบัติ

1. ตรวจสอบโดยให้ผู้ป่วยพูด ถ้าพูดไม่สามารถออกเสียงได้ แสดงว่าสายเข้าที่หลอดเสียงและใช้เครื่องฟัง (Stethoscope) มาวางที่ลิ้นปี่ แล้วนำกระบอกฉีดยาคันลมประมาณ 5-10 ซีซี จะได้ยินเสียงฟู่ต ใช้กระบอกฉีดยาคูดน้ำย่อยออกจากกระเพาะ จะได้น้ำย่อยออกมา
2. เมื่อแน่ใจว่าใส่สายอยู่ในกระเพาะอาหาร ให้นำพลาสติกตัดเป็นรูป Y แล้วนำมาพันที่ปลายจมุก
3. หักพับสายหรือปลายสายด้วย Gauze
4. จัดทำผู้ป่วยในท่าที่สุขสบาย ถอดถุงมือ และนำอุปกรณ์ไปทำความสะอาด